护理人员可如何协助?

護理人員有責任仔細觀察帕金遜病患者的駕駛狀況,並有禮貌地指出駕駛中存在的問題。

護理人員可能需要說服他們,讓他們認識到他們駕車是不安全的。也可以通過駕駛測驗或專業人士來幫助說服。護理人員也可以提供替代辦法,幫助帕金遜氏症患者。這些選擇可以是使用本地公共交通系統,乘用計程車及一些市府提供的服務。

雖然計程車的費用似乎很昂貴,不過自家汽車 的使用維修費用也是非常高的。比較一下就會 發現,兩者的費用是很接近的。家人和朋友可 以開車載他們。護理人員也可以把公交車的行 駛路線和計程車的電話號碼給他們記下來。

你的責任是什麼?

駕駛可能是個人的生活中的重要的一環,放棄 駕車是很難的決定。不過,你的安全,以及道 路上其他人的安全,是非常重要的。如果你覺 得你的駕駛能力不達到安全標準的規定,你就 應該諮詢你的醫生。 此信息不應被作為醫療方案,也不能替代你醫生的建議 帕金遜教育計劃 鼓勵以教育為目的複制。 請勿更改的本文件內容和作者的信息。

This information should not be used as a substitute for the medical care and advice of your physician Copyright @ 2008

Parkinson's education program

Copying for the educational purposes is encouraged.

It is not permitted to make changes to the written content of

this document and author's information.



Abdul Qayyum Rana 醫學博士, FRCPC會員,神經科專家 東多倫多帕金遜診所

2863 Ellesmere Rd, Suite 404 Scarborough, Ontario, Canada Phone: 416-724-9850 Fax: 416-724-1985

有關帕金遜氏症與駕駛的常見問題

東多倫多帕金遜疾病門診 神經科專家A, Q, Rana,博士 (FRCPC會員)

Dr. Abdul Qayyum Rana. MD. FRCPC World Parkinson's Education Program



Brving
Chinese Traditional

患有帕金遜疾病會影響你駕駛汽車嗎?

帕金遜氏症本身和服用治療帕金遜氏症的藥物引起的副作用,都可能會影響你的駕車能力。因為帕金遜氏症是在老年人中常見的病,所以年齡對此的影響也是很大的。在一項由國家對預防受傷與控制中心在1999年的研究中發現,在65-74歲這個年齡組別,因受傷而引致死亡事故中,車禍事故是最常見原因。而在75-84這個年齡組別,車禍是僅次於跌倒的第二個最常見的事故。

當然,患有帕金遜氏症並不一定意味著你將無 法駕車。然而患有嚴重的帕金森氏病的人,發 生交通意外的危險是很大的。因此,你一定要 慎重判斷你自己是否適合駕車。不安全的駕車 者不單危害自己,也會傷害其他人。

帕金遜氏症如何影響你的駕駛技能?

用於治療帕金遜病的藥物可能會引起一些副作 用,比如突發性嗜睡,視力模糊,發困,精神 恍惚,頭暈,從而影響你的正常駕駛。

你什麼時候應該停止駕駛車輛?

自行我評估,及判斷你是否適合駕駛是很難的。許多人對於自己的駕駛能力都過於自信,而沒有意識到,他們已經不適合駕車。駕車也是一個人獨立的象徵,所以人們都很珍惜它。

你應該與你的家人和朋友商量,並諮詢他們對你的駕駛技能的意見。傾聽他們的顧慮,並確定問題的嚴重程度。在任何時候,你都應該避免在擁擠道路上,在夜間和在惡劣天氣的下駕駛。

如果你駕駛時曾遇到危險事故狀況,或者,如 果你不再覺得可以安心駕駛,你應該考慮參加 防禦性駕駛課程。你也可以聯絡你當地的駕駛 中心,並做駕駛測驗,看看你是否應該繼續駕 駛。當然,如果你沒有通過考試,你的駕照將 被吊銷。一些駕駛學校可以讓你做模擬路試, 並讓你知道你是否能通過真正的路試。

一些康復中心可以作出非路面性的評估,檢查 你的反應時間和記憶測試,看看這些因素影響 你駕駛的程度。此外,如果你有晚期的帕金遜 病,你應該考慮放棄駕駛。當你增加抗帕金遜 病藥物的劑量,或是開始使用新的藥物時,一 定要格外小心。