

حوالہ شانی

﴿2﴾

آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات

پارکنسن کا مرض اور

اس کا علاج

Treatment of Parkinson's disease

(اردو)-Urdu

Dr. Abdul Qayyum Rana

Neurologist

پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم رانا

ایم ڈی (امریکہ) ایف آر سی پی سی (کینیڈا) ایف آر سی پی اے (برطانیہ)

نیورالوجسٹ

ورلڈ پارکنسنز پروگرام، ٹورانٹو، کینیڈا

www.pdprogram.org

World Parkinson's Program

Toronto, Canada

منہ کا خشک ہونا، مٹانے کی کمزوری، قبض ہونا، نظر کے مسائل، فریب نظر

6۔ سی او ایم ٹی انہیبیٹرز (COMT Inhibitors)

لہنتیکاپون (Entacapone)

200 ملی گرام لیوڈوپا کی ہر خوراک کے ساتھ اور روزانہ کل 1600 ملی گرام

تک لی جاسکتی ہے۔

مضرات:-

پیشاب کا رنگ زرد ہو جانا، پیشاب، لیوڈوپا کے مضرات کو بڑھا سکتی ہے۔

مندرجہ بالا تباہی معلومات عامہ کے لیے فراہم کی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔

بہلہ فرق طباعت محفوظ ہیں تاہم بغیر کسی ترمیم کے نوکالی کی اجازت ہے۔ یہ بروشرز مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

www.pdprogram.org

Dr. A.Q. Rana. M.D. FRCPC(Canada), FRCP-Hon

(U.K)

Neurologist

World Parkinson's Program

Toronto, Canada

ورلڈ پارکنسنز پروگرام کا مشن پارکنسن کی بیماری سے متعلق صحیح اور مکمل معلومات

فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے بانی کینیڈا کے نیورالوجسٹ ڈاکٹر عبدالقیوم

رانا ہیں۔ اس پروگرام کی شاخیں دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ مزید

معلومات کے لیے آپ مندرجہ ذیل ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔

www.pdprogram.org

0.5 ملی گرام دن میں ایک بار سے شروع کر کے 1 ملی گرام دن میں ایک بار

تک استعمال کر سکتے ہیں۔

مضرات:-

جوڑوں کا درد، غلہ، لیوڈوپا کے ساتھ لینے سے اس کے مضرات کو بڑھا سکتی

ہے۔

ii۔ سلیگیلین (Selegiline)

5 ملی گرام صبح میں ایک بار اور بڑھا کر 5 ملی گرام دن میں دو بار لے سکتے ہیں۔

(آخری خوراک دوپہر کے آغاز میں لے لیں)

مضرات:-

بے خوابی بالخصوص جب دوسری خوراک شام کو دیر سے لی جائے۔ لیوڈوپا کے

ساتھ استعمال کرنے سے اس کے مضرات کو بڑھا سکتی ہے۔

4۔ امینٹاڈائن (Amantadine)

100 ملی گرام دن میں ایک بار سے شروع کر کے تین بار تک استعمال کرتے

ہیں۔

مضرات:-

ٹانگوں میں سوجن کا آجانا، بازو ٹانگوں پر سرخ دھبے پڑ جانا، فریب نظر

5۔ اینٹی کولینرژکس (Anticholinergics) ٹرائی ہیکسی فینڈیل

(Trihexyphenidil)

1 ملی گرام روزانہ ایک بار سے شروع کر کے آہستہ آہستہ 2 ملی گرام دن میں تین

باری لی جاتی ہے۔ روزانہ 5 ملی گرام دن میں تین بار تک بڑھائی جاسکتی ہے۔

مضرات:-

ابتداء میں 50/12.5 ملی گرام کپسول دن میں ایک بار شروع کی جاتی ہے آہستہ آہستہ بڑھا کر 100/25 ملی گرام کپسول دن میں تین بار لی جاسکتی ہے۔ روزانہ 300 ملی گرام سے ٹوٹل 2000 ملی گرام تقسیم کر کے دن میں کئی بار لی جاسکتی ہے۔

معراضات:-

چکر آنا، جی متلانا، خواب سی کی کیفیت

2- ڈوپامین ایگونیٹ (Dopamine Agonist)

(i) پرمیپاکسول (Pramipaxole)

ابتداء میں 0.125 ملی گرام دن میں تین بار سے بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 1.5 ملی گرام دن میں تین بار استعمال کی جاسکتی ہے۔

معراضات:-

متلی کی کیفیت، ایک دم نیند میں چلے جانا، جوا کھیلنا، زیادہ کھانا، زیادہ خریداری کرنا، فریب نظر، ٹانگوں میں سوجن اور جنسی خواہش کا بڑھنا

(i) روپینارول (Ropinirole)

ابتداء میں 0.25 ملی گرام دن میں تین بار استعمال کی جاتی ہے آہستہ آہستہ بڑھا کر انتہائی خوراک 8 ملی گرام دن میں تین بار استعمال کی جاتی ہے۔

معراضات:-

متلی کی کیفیت، ایک دم نیند میں چلے جانا، جوا کھیلنا، زیادہ کھانا، زیادہ خریداری کرنا، فریب نظر، ٹانگوں میں سوجن اور جنسی خواہش کا بڑھنا۔

3- ایم اے او پی انہیبٹرز (MAOB Inhibitors)

i- رازاگیلین (Rasagiline)

اور اپنی کیفیت کے بارے میں تفصیلاً مشورہ کرنا۔

☆ ایک مقرر کردہ فارمیسی سے ہی ہر بار دو لینا بہتر ہے تاکہ ان کے پاس آپ کی دوائیوں کا سارا ریکارڈ موجود رہے ہر بار اپنے فارماسٹ سے اپنی دوائیوں کے بارے میں مشورہ کرنا۔

☆ دوا استعمال کرتے وقت ایک گلاس پانی پینا دوا کے جذب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

کونسی ادویات پارکنسن کے مرض کے علاج کیلئے استعمال ہوتی ہیں؟

1- لیوڈوپا (Levodopa)

ابتداء میں 100/25 ملی گرام 1/2 گولی روزانہ ایک بار آہستہ آہستہ بڑھا کر 1 گولی دن میں تین بار استعمال کی جاتی ہے۔ روزانہ کی خوراک 300 سے لیکر ٹوٹل 2000 ملی گرام تقسیم کر کے دن میں کئی بار استعمال کر سکتے ہیں۔

معراضات:-

چکر آنا، جی متلانا، خواب سی کی کیفیت

ii- لیوڈوپا/کارب ڈوپا سی آر

Levodopa/carbidopa CR کنٹرولڈ ریلیز
100/25 گولی یا 200/50 ملی گرام گولی دن میں کئی بار استعمال کر سکتے ہیں۔

معراضات:-

چکر آنا، جی متلانا، خواب سی کی کیفیت

iii- لیوڈوپا/بنسارازائیڈ

(Levodopa/Bensarazide)

پارکنسن کے مرض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟

بدقسمتی سے اس مرض کا کوئی دائمی اور مستقل علاج نہیں ہے لیکن بہت ساری ایسی ادویات موجود ہیں جن کے استعمال سے مریض کی علامات میں بہتری ہو جاتی ہے۔ ادویات کے علاوہ فزیوتھراپی اور سچ تھراپی سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ کچھ مریض نیوروسرجری سے بھی افادیت حاصل کر سکتے ہیں۔

میرے لیے کونسا علاج مناسب ہے؟

ہر مریض کا علاج دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے جس کا دار و مدار مختلف عوامل پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیماری کی شروعات یا جسم کے خاص اعضاء کا متاثر ہونا۔ ایک کام کرنے والے شخص کا علاج ایک بوڑھے اور ریٹائرڈ شخص سے پہلے شروع کر سکتے ہیں تاکہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر نہ ہو۔ عموماً ادویات کا آغاز اس وقت شروع کر دیا جاتا ہے جب مریض کو عام روزمرہ زندگی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔

یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ادویات سے بیماری کا دائمی سدباب نہیں ہوتا لیکن اس کی علامات بہت بہتر ہو جاتی ہیں اور مریض کی روزمرہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔

اپنے معالج کے مشورے کے بغیر اپنی دوائیوں میں ترمیم بالکل نہیں کرنی چاہیے۔

کن اقدامات سے علاج میں بہتری لائی جاسکتی ہے؟

☆ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق باقاعدگی سے مقررہ وقت پر دو لینا نہایت ضروری ہے۔

☆ سال میں کم از کم دو بار ڈاکٹر کے پاس طبی معائنہ کے لیے جانا اور ادویات